

У ВАС КОРОНАВИРУС
БЕЗ СИМПТОМОВ,
В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ
ИЛИ ОРВИ?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

НАСМОРК
И ЗАЛОЖЕН
НОС?

используйте
солевые
растворы

ПРИНИМАЙТЕ
ВИТАМИНЫ И СИРУПЫ

ИЗМЕРЯЙТЕ
ТЕМПЕРАТУРУ
НЕ РЕЖЕ 3 РАЗ В СУТКИ

СОБЛЮДАЙТЕ
ПИТЬЕВОЙ
РЕЖИМ

НУЖЕН
БОЛЬНИЧНЫЙ?
звоните
122 или
в поликлинику



ПОДНЯЛАСЬ
ТЕМПЕРАТУРА (ДО 38)?
примите
жаропонижающее

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА



ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 38° ДЕРЖИТСЯ БОЛЬШЕ ДВУХ ДНЕЙ? ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ НЕ ПОМОГАЮТ?

Звоните в call-центр вашей поликлиники или в единую службу «122»



получите дистанционную консультацию с медицинским работником

УРОВЕНЬ САТУРАЦИИ МЕНЕЕ 94-95%?

Звоните в единую службу «103» для вызова скорой помощи

НЕ ПРИНИМАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО АНТИБИОТИКИ!



Официальная страница Свердловской области ВКонтакте и в Одноклассниках

ПОВОД ДЛЯ ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ



112



Нарушения сознания



Нарушения дыхания



Нарушения системы кровообращения



Внезапный болевой синдром



Любые травмы



Термические и химические ожоги



Внезапные кровотечения



Психические расстройства, при которых человек совершает опасные действия



Роды, угроза прерывания беременности



Внезапные нарушения функции органа или системы органов



ЕСЛИ У ВАС:



ухудшение самочувствия –
слабость, головная боль,
незначительное повышение
температуры тела,
заложенность носа, боль
в горле, потеря обоняния
и вкуса

**НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ
В СЛУЖБУ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ**



**единий call-центр
по оказанию помощи при COVID-19**



5 ВОПРОСОВ О ШТАММЕ COVID-19 «ОМИКРОН»

По данным ФБУН МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора



Чем симптомы «омикрона» отличаются от симптомов «дельты»?

При заражении штаммом «омикрон»

- сильнее беспокоят слабость и головные боли
- гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения
- симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита
- иногда отмечаются низкая температура тела, а у детей – высыпания



Где риски заразиться штаммом «омикрон» более высокие?

В связи с более высокой контагиозностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. Наиболее высок риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы. Соблюдение социальной дистанции и использование защитной маски хоть и не исключает риск заражения полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим, однако значительно снижает вероятность передачи вируса



Какой инкубационный период у «омикрона»? Чем он отличается от штамма «дельта»?

По данным, имеющимся на сегодняшний день, инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» чаще всего составляет от 3 до 6 дней, но в разных группах людей он может несколько отличаться. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий день или через день после контакта.

Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с штаммом «дельта»



Через какое время после заражения «омикроном» тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть в период от 1 до 6 дней после заражения

